

Servei d' Anestesiologia CSI

ANALGÈSIA OBSTETRÍCIA

- SETEMBRE 2012 -

		PAUTA	RESCAT
1	Part EUTÒCIC	IBUPROFÈ 600 mg VO / 6 – 8 h	Metamizol
			575 mg VO
<i>oral</i>	<i>Administració</i>	<i>Si al·lèrgia : Metamizol 575 mg VO / 6 – 8h</i>	
	<i>a la Unitat H.</i>		<i>(màx. c/ 8h)</i>
2	Part EUTÒCIC	DEXKETOPROFÈ 50 mg EV / 8 h	Metamizol
	amb episio ample		2 gr EV
<i>EV</i>			
	<i>o part</i>	<i>Si al·lèrgia : Metamizol 2 gr EV / 8 h</i>	<i>(màx. c/ 8 h)</i>
	INSTRUMENTAT		
		DEXKETOPROFÈ 50 mg EV / 8 h	Tramadol
3	CESÀRIA	+	50 mg EV
		METAMIZOL 2 gr EV / 8h (alterns)	<i>(màx. c/ 8 h)</i>
<i>EV</i>			
	<i>a les 48 h, passar</i>	<i>Si al·lèrgia a AINEs (Dexketoprofè, AAS,</i>	
	<i>a pauta</i>	<i>Diclofenac, o Ibuprofè) :</i>	
	<i>part eutòcic</i>		
		Tramadol 50 mg (½ amp) EV /8 h	
		+ Paracetamol 1 gr EV c/ 8 h (alterns)	
		2on RESCAT a <u>part eutòcic (1) i instrumentat (2)</u> : Paracetamol 1 gr EV(màx c 8h)	

PART EUTÒCIC EXPULSIU (sense anestesia locorregional)

Administrar a àrea quirúrgica –dosi única-

Metamizol 2 gr EV

Si al·lèrgia: : Dexketoprofè 50 mg EV

ÒBIT FETAL

Previ expulsió fetus i peridural à Metamizol 2gr + Diacepam 5 - 10 mg SL

Posteriorment, iniciar pauta : Dexketoprofé 50mg EV/8h

+ Metamizol 2gr 8 h (altern)

rescat: tramadol 50mg (dosis única) + ondansetró 4mg ev +

Post expulsió fetusà seguir mateixa pauta +

Loracepam 1mg VO nit

LEGRAT UTERÍ

Actuar igual que part instrumentatà Dexketoprofè 50mg EV/ 8h
rescat Metamizol 2g EV/8h

RECORDAR :

DEXKETOPROFÈ EV / 8 h : màx 48 HORES

Pautes 2 i 3 : Pantoprazol 40 mg VO o EV / 24 h

Si administració de Tramadol : pautar Ondansetró 4 mg EV / 12 h

Si persisteixen nàusees – vòmits +++ : administrar Haloperidol ½ amp (2,5 mg) IM